

Soort	Stekmethode	Stekinstructie	Beste plek in voedselbos	Beste stektijd
▣ Zwarte bes	Halfhoutstek	10-15 cm scheut, bladeren halve	Randbeplanting, tijdelijk bij jonge	Juli-augustus
▣ Rode bes	Halfhoutstek	Tak zonder bloemknoppen, licht b	Zonnige randen, tijdelijke haag	Juli-augustus
▣ Kruisbes	Halfhoutstek	Gezonde tak zonder meeldauw	Halfschaduw, onder bomen	Juli-augustus
▣ Jostabes	Halfhoutstek	Sterke groeier, 15 cm stek	Tussen jonge bomen, insectenlok	Juli-augustus
▣ Honingbes	Zomerstek	Zachte topstek, vochtige lucht	Noordrand, vochthoudende bode	Juli-augustus
▣ Appelbes	Halfhoutstek	10-15 cm, bladeren halveren	Windbreker, haag, randen	Juli-augustus
▣ Vlier	Halfhoutstek of wortelstek	Halfrijpe tak of wortelstuk	Randplant, snelle pionier	Augustus
▣ Gele kornoelje	Halfhoutstek	Veel vocht nodig	Bufferzones, bijenplant	Augustus
▣ Elsbes	Halfhoutstek	Voorzichtig behandelen	Hogere struiklaag, buffer	Augustus
▣ Kiwi	Zomerstek	2 bladknopen, bladeren halveren	Pergola, steunbomen	Juli-augustus
▣ Druif	Zomerstek	Okselscheut, warme plek	Zuidzijde, pergola	Juli-augustus
▣ Kamperfoelie	Halfhoutstek	2-3 bladparen, halfhoutige tak	Door hagen, bijenplant	Juli-augustus
▣ Rozemarijn	Zomerstek	10 cm topstek, basis kaal	Droge rand, volle zon	Juli-augustus
▣ Lavendel	Halfhoutstek	Niet-bloeiende tak, luchtige mix	Zuidhelling, bijenplant	Augustus
▣ Tijm	Zomerstek	Topstek, warme omgeving	Bodembedekker, randplant	Juli-augustus
▣ Citroenmelisse	Top- of wortelstek	Wortelt ook in water	Onder fruitbomen, schaduw	Juli-augustus
▣ Oost-Indische kers	Topstek	Kortlevend, snelwortelend	Tijdelijke bodembedekking	Juli-augustus
▣ Vijg	Zomerstek of wortelstek	Stek met 2 knopen, bladeren halv	Zuidmuur, beschut plekje	Augustus
▣ Siberische erwtenstruik	Halfhoutstek	15 cm tak, bladeren deels verwijd	Windbreker, randplant	Augustus
▣ Vaste lupine	Wortelstek	Wortel doorsnijden, herplanten	Bodemverbeteraar door systeem	Aug./herfst